

Tabela 1: Inwentaryzacja dendrologiczna

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA PRZY PLACU ZABAW – GPNT												
LP.	nazwa łacińska	nazwa polska	parametry dendrometryczne			stan						uwagi i zalecenia
			wys. [m]	średn. korony [m] i kierunek	obw. pnia [cm]/pow. krzewu [m2]	ogólny	korona	posusz (%)	pień	pochylenie (°)/pochylenie (°)	korzenie	
1	<i>Crataegus monogyna</i>	Głóg jednoszyjkowy	4,5	4,5	51 / 20 / 36 / 25 / 26 / 37 (zwarta grupa pni)	dobrym	typowa, dosyć zwarta i gęsta, suche i złamane konary	20	wiele pni, wiele odrostów	10W	niewidoczne	do usunięcia ze względów projektowych
2	<i>Salix fragilis</i>	Wierzba krucha	5	4	33 / 20 / 21 / 14 / 13 / 15 (wieloodrostowa)	średni	Wieloodrostowa, dosyć gęsta	30	pochylony, wiele odrostów pniowych i korzeniowych	30E, 20W	niewidoczne	do usunięcia ze względów projektowych
3	<i>Salix fragilis</i>	Wierzba krucha	4	3	25 / 23 / 14 / 13 / 15 (wieloodrostowa)	średni	Wieloodrostowa, lekko przerzedzona	30	pochylony, wiele odrostów pniowych	45SE	niewidoczne	do usunięcia ze względów projektowych
4	<i>Quercus robur</i>	Dąb szypułkowy	12	7	104	bardzo dobry	rozłożysta, typowa, kolizja z Lipą	15	prosty, ślady po dawnych konarach	5S	niewidoczne	dalsza pielęgnacja i usunięcie posuszu
5	<i>Tilia cordata</i>	Lipa szerokolistna	11	7	65 / 63 / 52 / 28 (rozwidła się od podłoża oraz na wys. ok 1m)	bardzo dobry	typowa, rozłożysta, kolizja z Dębem	10	wiele pni, powyginane, pochylone, ślady po dawnych konarach	10N / 10SW / 20N	nie widoczne	dalsza pielęgnacja i usunięcie posuszu

Tabela 1: Inwentaryzacja dendrologiczna

6	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	7	3	32	średni	przerzedzona od dołu, wierzchołkowa	20	Powyginały, ślady odłamań, kolizja z Jaśminowcem i Lipą	10W	niewidoczne	dalsza pielęgnacja i usunięcie posuszu
7	<i>Philadelphus coronarius</i>	Jaśminowiec wonny	3	4,5 / 6	25m2 (zwarta grupa krzewów)	dobrym	typowa rozłożysta, mocno zagęszczona	20	zwarta grupa wielopniowa, powyginały w różnych kierunkach	–	niewidoczne	kolizja z innymi drzewami, częściowe usunięcie ze względów projektowych, powierzchnia do ustalenia przy wykonawstwie
8	<i>Larix decidua</i>	Modrzew europejski	10	3	96	martwe	–	100	prosty suchy	–	niewidoczne	usunięcie ze względu na stan oraz zagrożenie przewrócenia
9	<i>Larix decidua</i>	Modrzew europejski	9,5	3	81	martwe	–	100	prosty suchy	–	niewidoczne	usunięcie ze względu na stan oraz zagrożenie przewrócenia

Tabela 1: Inwentaryzacja dendrologiczna

10	Grupa samosiewów: <i>Rubus</i> , <i>Acer platanoides</i> <i>Salix fragilis</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Philadelphus coronarius</i> itp..	Grupa samosiewów: Jerzyny, Klon pospolty, Wierzba krucha, Głóg jednoszyjkowy, Dąb szypułkowy, Jaśminowiec wonny itp..	1-3	nie przekraczająca 1m	3-10	Bardzo słaby	zdeformowane, rachityczne,	20-50	zdeformowane ze względu na konkurencję z innymi roslinami	–	nie widoczne	usunięcie ze względów projektowych
----	--	---	-----	-----------------------	------	--------------	----------------------------	-------	---	---	--------------	------------------------------------